

**Bexiga:** Moderadamente repleta por conteúdo anecogênico, discreta quantidade de sedimentos. Parede normoespessa para o grau de repleção (0,12 cm), com margens regulares. Ausência de litíase. Uretra proximal medindo 0,16 cm.

**Rins:** Em topografia habitual. Dimensões usuais (comprimento: esquerdo: 3,31 cm; direito: 3,87 cm) e contornos irregulares. Corticais hiperecogênicas e ecotextura homogênea. Medulares com ecogenicidade e ecotextura preservadas. Manutenção da definição e redução da relação corticomedulares. Sem sinais de hidronefrose ou litíase. (Nefropatia moderada bilateral - Diag. dif.: Deposição de gordura comum na espécie felina / Processo degenerativo / outros).

**Adrenais:** Formato, ecogenicidade e ecotextura preservados bilateralmente. Adrenal esquerda com dimensões habituais, medindo 0,46 x 0,46 x 0,84 cm (espessura do polo caudal x espessura do polo cranial x comprimento). Adrenal direita não visibilizada.

**Fígado:** Dimensões preservadas, com bordas afiladas e superfícies regulares. Ecogenicidade aumentada e ecotextura preservadas. Vascularização com calibre e trajeto preservados. (Hepatopatia leve - Diag. dif.: Infiltração gordurosa / outros)

**Vesícula biliar e Vias Biliares:** Vesícula repleta, com parede fina e regular medindo 0, cm, conteúdo anecogênico. Vias biliares sem sinais de dilatação.

**Baço:** Dimensões discretamente aumentadas medindo 1,46 cm em topografia de corpo, com bordas afiladas e superfícies regulares. Ecogenicidade usual e ecotextura homogênea. (Esplenomegalia discreta - Diag. dif.: Esplenite / outros)

**Estômago:** Pouco repleto por gás, com paredes normoespessas (0,cm) e manutenção do padrão de estratificação parietal. Sem evidências de processo obstrutivo.

**Obs.:** A Os artefatos de imagem formados por conteúdo gástrico alimentar e gasoso podem impedir a detecção ultrassonográfica de possíveis corpos estranhos. Exames de imagem complementares como radiografia e endoscopia podem ser necessários para tal diagnóstico.

**Intestinos:** Segmentos parcialmente visibilizados. Manutenção do padrão de estratificação parietal. Intestino delgado com paredes normoespessas (duodeno: 0,34 cm; jejuno: 0,09 - 0,15 cm), apresentando conteúdo gasoso e peristaltismo habitual. Intestino grosso com paredes normoespessas (cólon: desc. 0,15 cm), contendo gás e fezes de aspecto ultrassonográfico usual. Sem sinais de corpos estranhos ou processo obstrutivo.

**Obs.:** Os artefatos de imagem formados pelo conteúdo intraluminal do trato gastrointestinal podem impedir a detecção de possíveis corpos estranhos e limitar avaliação de estruturas anatômicas subjacentes.

**Pâncreas:** Parcialmente visibilizado em lobo direito. Contornos regulares e dimensões próximas ao limite superior (espessura: 0,80 cm). Ecogenicidade aumentada e ecotextura homogênea, presença de reatividade tecidual adjacente. (Pancreatopatia a esclarecer - Diag. dif.: Inflamatório / outros).

**Testículos:** Não visibilizados.

**Cavidade Abdominal:** Sem evidências de linfadenomegalia, peritonite ou efusão abdominal.

**\*\*O exame ultrassonográfico possui limitações inerentes a técnica, e modalidades diagnósticas adicionais podem ser necessárias para a elucidação do quadro clínico. Somente o Médico Veterinário responsável está apto para interpretar os resultados do presente exame, sempre em associação com os achados clínicos e laboratoriais do paciente.**