



HOSPITAL VETERINÁRIO DA ANCLIVEPA-SP

DATA: 31/01/2023

PACIENTE: MESSIAS / ROSEMEIRE (508272)

RELATÓRIO ULTRASSONOGRÁFICO

Bexiga: em topografia não habitual – alojada em região perianal esquerda com distensão leve, paredes irregulares e espessas, sem sedimentos. Uretra caudal não caracterizada.

Rins e Ureteres: dimensões preservadas (RD 3,93cm / RE 4,92cm), rim esquerdo hipertrófico se comparado ao direito, parênquima homogêneo normoecóico, distinção e da proporção cortico medular alterada no rim esquerdo, sistema pielocalicial preservado. Ausência de mineralizações.

Baço: em topografia habitual, com dimensões aumentadas (1,97cm), parênquima heterogêneo reticulo nodular, vasos preservados.

Fígado: Topografia habitual, lobos hepáticos com parênquima homogêneo normoecóico. Diafragma preservado. Grandes vasos preservados. Ductos intra-hepáticos não caracterizados. Vesícula biliar: repleção adequada, preenchida por conteúdo anecoico sem sedimentos, paredes normoecoica normoespessa. Ducto biliar não caracterizado.

Estômago: não caracterizado sem janela acústica para avaliação.

Pâncreas: não caracterizado.

Alças Intestinais: verifica-se deslocamento dos segmentos intestinais em sua maior parte para a região perianal direita – jejuno sem conteúdo e cólon com fezes densas.

Próstata: deslocada para a região perianal esquerda – apresenta aumento do tamanho (4,80cm x 2,23cm x 4,40cm) contornos pouco definidos, parênquima heterogêneo com áreas císticas, uretra prostática não caracterizada.

Testículos: parâmetros ultrassonográficos preservados.

Observações:

Ausência de líquido livre

Em região epigástrica medial há grande e extensa neoformação que desloca estomago e oclui a visibilização de parte dos lobos hepáticos medial e lateral esquerdo, assim não foi possível determinar a origem desta formação que se apresenta solida com áreas mais ecogênicas densas delimitadas por área anecoica. Mensurada a partir de 7,5cm x 5,6cm.


Dra. PAULA NOGUEIRA CUNHA
MV CLINICA GERAL - APERFEIÇOAMENTO ULTRA-SONOGRAFIA
CRMV 13618-SP
CPF 122.038.818-10

IMPRESSÃO ULTRASSONOGRÁFICA:

Esplenomegalia reticulo nodular – hematopoese extra medular/ linfoma??

Em região epigástrica medial há grande e extensa neoformação que desloca estômago e oclui a visualização de parte dos lobos hepáticos medial e lateral esquerdo, assim não foi possível determinar a origem desta formação que se apresenta solida com áreas mais ecogênicas densas delimitadas por área anecoica.

Mensurada a partir de 7,5cm x 5,6cm

Hernia perianal bilateral – conteúdo intestinal, prostático e bexiga urinária – na região perianal esquerda a próstata alojada possui alterações sugestivas de neoplasia ou processo inflamatório crônico.

